

Электроды 3M Red Dot 2670-5 40 40 мм

ФСЗ 2010/07777

основа ткань, форма квадратная 40×40 мм, взрослый / детский, адгезивный гель

3M Health Care, США



Характеристики

Основа	ткань
Форма	квадратная 40×40 мм
Размер	взрослый / детский
Область применения	ЭКГ
Гель	адгезивный

Дополнительные характеристики

Электроды 3M Red Dot 2670-5 40×40 мм для мониторинга с возможностью однократной смены места прикрепления.

В данной серии электродов используется более активный адгезив по сравнению с адгезивом серии 2660, поэтому электроды 2670 должны использоваться в тех случаях, когда адгезии электродов 2660 недостаточно. Данный вид электродов имеет большую проводящую площадь для улучшения качества регистрируемой ЭКГ и снижает количество артефактов.

Можно единожды поменять место прикрепления электродов без необходимости замены их на новые, что позволяет добиться эффекта экономии.

Отличное качество мониторинга, мягкое повторение контуров тела и небольшая толщина позволяет электродам дольше находиться на коже пациента, что в результате также способствует экономии.

Комфарту пациента способствует мягкость материала основы электрода (по сравнению с электродами на пенистой основе).

Максимальная рекомендуемая длительность нахождения на коже пациента: 3 дня.

Размер электрода: 3.59 см x 3.59 см. Высота без коннектора: 0.08 см.

Рентгенопрозрачные, не использовать при МРТ.

Основы электрода - мягкая ткань. Двухфазный адгезив (обладает одновременно проводящими свойствами и является адгезивом, чувствительным к давлению). Коннектор: рентгенопрозрачная защелка.

Диаметр защелки - 9,5 мм. Материал датчика: карбоновый пластик. Подложка - полиэстер с силиконовым покрытием. Гель: проводящий адгезив.

Материал электродов и упаковки не содержит латекса и поливинилхлорида.

Электроды одноразовые Red Dot для ЭКГ с возможностью однократной смены места прикрепления, рентгенпрозрачные, с повышенной адгезивной способностью. Применяются в отделениях кардиологии (для телеметрии, холтер-мониторинга, стресс-тестов, эхокардиографии, катетеризации, при интенсивной тераии и кардиореанимации), операционных, отделениях неотложной терапии.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией или получить консультацию специалиста.