Ортез для закрепления ключицы ORTEX 012

ФСЗ 2010/08002



корсет корректор осанки, для верхнегрудного отдела, материал хлопок / трикотажное полотно, застежка контакт, цвет белый

Ortex spol. s.r.o., Чехия

Характеристики

Тип	корректор осанки
Назначение	для верхнегрудного отдела
Материал	хлопок / трикотажное полотно
Фиксация	застежка контакт
Цвет	белый

Дополнительные характеристики

В основе изделия - текстильный бандаж из сэндвичного материала. У изделия нет ни одной металлической части. Ортез состоит из трех частей: корсета для закрепления ключицы и двух затягивающих ремней. У корсета для закрепления ключицы есть управляющие пряжки. Два затягивающих ремня пришиты к корсету, а на концах оснащены текстильными застежками. Внутренняя часть плечевого бандажа из 100%-го хлопкового трикотажа. Использованный материал очень приятный в носке и хорошо переносится пациентами с чувствительной кожей. Плечевой бандаж (ортез) ORTEX 012 заменяет до сих пор используемое закрепление, так называемое «Stella Dorsi», которое производится из ваты и бинтов. Такое закрепление необходимо в течение всего времени лечения перелома ключицы на протяжении 3-4 недель.
Показания: хирургия, неврология, травматология, ортопедия, реабилитация.
Ортез можно использовать при переломах ключицы и ее акромиального конца. Можно использовать и для коррекции неправильной осанки. ORTEX 012 выходит из уже проверенных зарубежных изделий, которые за границей применяются в большом масштабе и полностью заменяют Stella Dorsi. Ортез для закрепления ключицы служит пациенту все время лечения. Ремни, проходящие над ключицей, подмышкой в области над верхним грудным позвоночником обладают достаточной эластичностью и мягкостью. Внутренний слой, приходящий в контакт с кожей, изготовлен из хлопчатобумажной махровой ткани, не раздражает, не оказывает аллергическое воздействие на кожу пациента. Крепление на пациента очень быстрое с помощью застежек в виде репейника.
Противопоказания: при экземе, дерматитах и гнойничковой инфекции зон, расположенных в месте применения ортеза. Противопоказаниями к применению ортеза служат показания к оперативному методу лечения.