Пластырь-повязка 3M Tegaderm Absorbent

ФСЗ 2010/07270

повязка, хирургический, противопролежневый, стерильный, основа пленочная, 7.6×9.5 см / 11.1×12.7 см / 16.8×19 см, паропроницаемый

3M Health Care, США



Характеристики

Исполнение	повязка
Тип	хирургический
Противопролежневый	Да
Вид	стерильный
Основа	пленочная
Размер	7.6×9.5 см / 11.1×12.7 см / 16.8×19 см
Паропроницаемый	Да

Описание

3M Tegaderm Absorbent прозрачная акриловая повязка.
Прозрачная стерильная абсорбирующая повязка на рану. Состоит из **акрилового гидрофильного полимерного волокна**, помещенного между 2-мя слоями прозрачной дышащей пленки Tegaderm.
Контактная сторона соприкасается с раневой поверхностью перфорированной основой, впитывая раневое содержимое полимерной акриловой прокладкой.
Верхняя сторона не перфорирована, проницаема для водяных паров и кислорода, но непроницаема для жидкости, бактерий и вирусов. Раневой экссудат движется через перфорацию и в результате диффузии адсорбируется в акриловую прокладку. Предназначена для ран с минимальным / умеренным количеством экссудата.

Размеры:
- 7.6 см × 9.5 см (впитывающая часть 3.8 × 5.7)
- 11.1 см × 12.7 см (впитывающая часть 6.0 × 7.6)
- 16.8 см × 19 см (впитывающая часть 11.75 × 14.3)

Преимущества:
- Может оставаться на ране **до 7 суток**.
- Полная прозрачность – хороший мониторинг раны без снятия повязки – реже смена повязок.
- Обеспечивает влажную среду заживления раны и поддерживает аутолитическое очищение раны под визуальным контролем.

- Удобна для пациента и медицинского персонала, проста в наложении и снятии.
- Надежный и эффективный барьер для инфекции.
- Надежно крепится, сохраняя адгезию даже на влажной коже.
- Не прилипает к раневому ложу.
- Может быть использовано как первичное покрытие на хирургическую рану, либо вторичное покрытие поверх альгинатов и гидрогелей.

Область применения:
- Пролежни 2-ой и 3-ей степени с минимальным / умеренным количеством экссудата.
- Ожоги 1-ой и 2-ой степени.
- Язвы диабетической стопы с минимальным / умеренным количеством экссудата.
- Артериальные язвы с минимальным или средним кол-вом экссудатаы.
- Рваные раны и ссадины.
- Донорские участки кожи.
- Хирургические раны и лапароскопические разрезы.
- Разрывы кожи.

Противопоказания: инфицированные раны.