

Воздуховод ларингеальный масочный LMA Fastrach № 3, 4, 5 одноразовый

ФСЗ 2008/02313

маска одноразовая, размер 3 / 4 / 5, с армированной трубкой воздуховода

Teleflex Medical, Ирландия



Характеристики

Тип	одноразовая
Материал	медицинский ПВХ
Размер	3 / 4 / 5
Возрастная категория	для подростков весом 30-50 кг / для взрослых весом 50-70 кг / для взрослых весом 70-100 кг
Армированная трубка воздуховода	Да

Дополнительные характеристики

Воздуховод LMA Fastrach™ одноразового использования обеспечивает проведение вентиляции и интубации, снижая вероятность десатурации. Разработан для ситуации неожиданных или прогнозируемых «трудных дыхательных путей» и сердечно-легочной реанимации. LMA Fastrach™ одноразового использования можно установить одной рукой из любого положения: без разгибания головы и сгибания шеи пациента; из нейтрального положения, и без введения пальца в рот пациента. В связи с тем, что воздуховод может быть использован как самостоятельное устройство, во время попыток интубации возможно проведение адекватной вентиляции. Это уменьшает вероятность возникновения эпизодов снижения сатурации, и оксигенация крови пациента остается постоянной. Воздуховодное устройство LMA Fastrach™ одноразового использования предназначено для использования в качестве альтернативы лицевой маске для обеспечения и поддержания проходимости дыхательных путей во время анестезии и неотложных анестезиологических пособий. Также его применение показано в случае прогнозируемых или неожиданных сложностей в обеспечении проходимости дыхательных путей и проводника для интубации трахеи. Воздуховод не должен использоваться в качестве замены эндотрахеальной трубки.

- Для экстренных случаев и «трудных дыхательных путей»;
- Интубирующая ларингеальная маска, полностью аналогичная LMA Fastrach многоразовая с той лишь разницей, что поставляется стерильной и готовой к использованию;
- Простая и быстрая техника введения, позволяющая быстро обеспечить вентиляцию;
- Идеально подходит для введения как в условиях медицинского учреждения так и до госпитализации пациента.

